

Ureaplasma urealyticum

Stanovenie prítomnosti Ureaplasmy urealyticum pomocou vysoko citlivej molekulárno – biologickej metódy PCR.

Materiál

Výter cervix – vagína, výter – uretra, moč

Frekvencia vyšetrenia

Denne

Statim

Ano

Referenčné hodnoty

Negatívny výsledok

Pozitívny výsledok

Interferencie

Vyšetrenie môže byť ovplyvnené technológiou odberu vzorky, stavom pacienta alebo stupňom infekcie.

Stručný medicínsky význam

Je veľmi často izolovaný z urogenitálneho traktu mužov aj žien (aj u zdravých ľudí). Jeho úloha pri vzniku infekcií je doposiaľ nejasná. Vyskytuje sa pri uretritídach, prostatitídach, pri neplodnosti u mužov i žien, a kongenitálnych nákazách novorodencov. Patogén môže perzistovať aj asimptomaticky. Morfologicky je podobná s mykoplazmami. Kultivácia ureaplaziem je možná, ale len a špeciálnych pôdach, preto sa na ich stanovenie stále častejšie používa metóda PCR. Tohto patogéna stanovuje laboratórium AdLa s.r.o. kvalitatívne aj kvantitatívne v rozmedzí 10^1 – 10^6 kópií DNA na 5 μ l vzorky.