

PepTest

Rýchle stanovenie Pepsínu

Materiál

sliny, sputum

Metóda

Imunologický in-vitro diagnostický test (imunochromatografia).

Odber materiálu

Aspoň 1ml slín.

Odber vzorky slín sa robí ráno. Potrebné je byť nalačno, bez umytia zub a najlepšie aj bez pitia, alebo maximálne si navlhčiť ústa malým množstvom čistej neperlivej vody.

30 minút pred testom sa neodporúča piť kofeínové a perlivé nápoje, fajčiť a 48 hod pred testom neužívať antacidá a alkalické vody.

Video – odber vzorky slín:

<https://www.youtube.com/watch?v=MVpwbvVv0YQ>

Frekvencia vyšetrenia

každý deň

Statim

Nie

Vyšetrenie je určené pre pacientov s dlhodobými tráviacimi ťažkosťami ako je chrapot, zahlienenie, pokašľávanie, pocit cudzieho telesa v krku, záchvatový kašeľ, erózia zubnej skloviny. Ide o vyšetrenie prítomnosti enzýmu – pepsín v slinách. Prítomnosť tohto enzýmu môže znamenať prienik žalúdočnej kyseliny do oblasti krku a nosa. Ak k tomu dochádza veľmi často môže byť sliznica hltanu, hrtanu a nosa poškodená. Dôsledkom môže byť chronický zápal, ktorý sa prejavuje bolesťami v krku, zápalmi dutín, poruchami hlasu, suchým kašľom, zahlienenie, zápach z úst. Tento test môže pomáhať zistiť, či tieto potažie nesúvisia s javom tzv. laryngofaryngeálny reflux.

PepTEST nie je hrađený zdravotnými poisťovňami a jeho cena je: 25 €.